


Proman®



- Largo espetro de ação
- Utilização sobre todas as variedades de batata
- Flexibilidade de misturas com outros herbicidas
- Aplicação em pré-emergência tardia

Alta voltagem

NOVO HERBICIDA BATATA



BELCHIM
Crop Protection™


Composição:
500 g/l metobromurão

Formulação:
Suspensão concentrada (SC)

Dose:
2-4 l/ha

A.V. nº:
0802

Embalagens:
1 l e 5 l



Metobromurão é uma substância ativa da família química das ureias (HRAC grupo C2).

Principalmente absorvido pelo sistema radicular das infestantes, com translocação no xilema para as folhas e interrompendo o processo de fotossíntese.

Os sintomas típicos após a emergência das infestantes são cloroses e necroses do tecido foliar.

Espetro de ação sobre as infestantes

		2 L	3 L		2 L	3 L
Dicotiledóneas						
Ambrósia	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>			Grizandra	<i>Diplotaxis erucoides</i>	
Amor-de-hortelão	<i>Galium aparine</i>			Lânia roxo	<i>Lamium purpureum</i>	
Amor-perfeito-bravo	<i>Viola arvensis</i>			Malvão	<i>Abutilon theophrasti</i>	
Atriplex	<i>Atriplex patula</i>			Moncos-de-perú	<i>Amaranthus retroflexus</i>	
Beldroega	<i>Portulaca oleracea</i>			Morugem-branca	<i>Stellaria media</i>	
Bolsa-de-pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>			Mostarda-dos-campos	<i>Sinapis arvensis</i>	
Camomila vulgar	<i>Matricaria chamomilla</i>			Sempre-noiva	<i>Polygonum aviculare</i>	
Capricho-de-carneiro	<i>Xanthium strumarium</i>			Serralha-macia	<i>Sonchus arvensis</i>	
Catassol	<i>Chenopodium album</i>			Tasneirinha	<i>Senecio vulgaris</i>	
Cipó enredadeira	<i>Polygonum convolvulus</i>			Urtiga bastarda	<i>Mercurialis annua</i>	
Corriola	<i>Convolvulus arvensis</i>			Verónica-da-pérsia	<i>Veronica persica</i>	
Ésula-camesice	<i>Euphorbia chamaesyce</i>			Monocotiledóneas		
Erva-da-modas	<i>Galinsoga parviflora</i>			Cabelo de cão	<i>Poa annua</i>	
Erva-moira	<i>Solanum nigrum</i>			Milhá-digitada	<i>Digitaria sanguinalis</i>	
Erva-moleirinha	<i>Fumaria officinalis</i>			Milhá pé-de galho	<i>Echinochloa crus-galli</i>	
Erva pessegueira	<i>Polygonum persicaria</i>			Raspasaias	<i>Setaria viridis</i>	
Flor-de-todas-as-horas	<i>Hibiscus trionum</i>					

■ muito suscetíveis ■ suscetíveis ■ moderadamente suscetíveis ■ moderadamente resistentes ■ resistentes

Infestantes



Posicionamento técnico em batateira

Finalidade.....Herbicida de pré-emergência para controlo de infestantes de folha larga e gramíneas.
Época de aplicação.....Depois da plantação e antes da emergência da cultura, o mais tardar até à fase BBCH09.

Dose homologada.....4 l/ha
Volume de água recomendado.....200-400 l/ha
Dose recomendada.....2 a 3 l/ha

